

## ਕੀ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

## ਮੇਰਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ
- ਜਿਨੀ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਨੀ ਲਵੋ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000mg ਕੈਲਸੀਅਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 1500mg ਕੈਲਸੀਅਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੈਲਸੀਅਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਲਸੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਵਿਚ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 300mg ਕੈਲਸੀਅਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ\*
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੈਲਸੀਅਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400IU's ਰੋਜ਼ਾਨਾ; 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਈ 800IU's ਰੋਜ਼ਾਨਾ
- ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਜਸ਼ ਕਰੋ (ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਤੁਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ ਜਾਂ ਰੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ)
- ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀ ਐਮ ਡੀ ਟੈਸਟ (BMD)ਕਰਵਾਓਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

\*ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ 1-800-463-6842 ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ [www.osteoporosis.ca](http://www.osteoporosis.ca).


## ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।


ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

**Osteoporosis Canada**  
1090 Don Mills Road, Suite 301  
Toronto, Ontario, Canada  
M3C 3R6  
(416) 696-2663 or 1-800-463-6842  
[info@osteoporosis.ca](mailto:info@osteoporosis.ca)  
[www.osteoporosis.ca](http://www.osteoporosis.ca)



**Osteoporosis Canada**  
**Ostéoporose Canada**



Osteoporosis Canada

Ostéoporose Canada

# ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋ?



## ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਚੂਕਣੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੁਕ ਕਿ ਭਾਰੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣੇ।

## ਅਸਰ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

- 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
- 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
- 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ 8 ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਸਦਕਾ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਯਕਦਮ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

## ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਿਫਾਰਿਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀ ਐਮ ਡੀ ਟੈਸਟ (BMD) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

## ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ\*

### ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ:

- 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
- ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ
- 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ
- ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣਾ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੂਕਣੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ)
- ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ (ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਗਲੂਕੋਕੋਰਟੀਕੋਆਇਡ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੈਡਨੀਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਲਿਐਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੋਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ
- ਮੁਢਲਾ ਹਾਈਪਰਪੈਰਾਥਾਈਰੁਆਇਡਿਜ਼ਮ
- ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਗਣ ਦੀ ਰੁਚੀ
- ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਔਸਟੀਓਪੀਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ
- ਹਾਈਪੋਗੋਨਾਡਿਜ਼ਮ (ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਨੀ ਪਹਿਰੇ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ)
- ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ (45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)

### ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਣ

- ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗਠੀਆ (ਰੂਮੋਟੋਈਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ)
- ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਡਿਜ਼ਮ
- ਕੜਵੱਲ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ
- ਹੈਪਾਰਿਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
- ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 57 ਕਿਲੋ (125 ਪਾਊਂਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ
- ਘੱਟ ਕੈਲਸੀਅਮ ਖਾਣੀ
- ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ (ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਫੀ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੀਣੇ)
- ਸ਼ਰਾਬ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣੀ (ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ)
- ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ

\* ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ

## ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ।

## ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ

- ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇਪਣ (ਬੀ ਐਮ ਡੀ) ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਛੋਟੇ ਸਦਮੇ ਕਰਕੇ) ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ
- ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ (ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਗਲੂਕੋਕੋਰਟੀਕੋਆਇਡ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੈਡਨੀਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣਾ

## ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

## ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ (BMD) ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।